

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Responden dalam penelitian ini paling banyak berusia lansia awal yaitu 46-55 Tahun (31,4%), berjenis kelamin perempuan (62,9%), memiliki tingkat pendidikan perguruan Tinggi (51,4%), bekerja sebagai ibu rumah tangga (31,4%) dan memiliki hubungan dengan pasien sebagai anak (40,0%).
- 5.1.2 Rerata lama rawat pasien diruang ICU yaitu 5,342 hari. Sebagian besar pasien riwayat lebih dari 5 hari yaitu sebanyak 18 responden (51,4%), <5 hari sebanyak 16 responden (45,7%) dan yang paling sedikit yaitu 5 hari sebanyak 1 responden (2,9%).
- 5.1.3 Tingkat kecemasan keluarga pasien yang di rawat diruang ICU RS Panti Rapih yaitu cemas ringan sebanyak 19 responden (54,3%)
- 5.1.4 Uji spearman menunjukkan nilai *p value* 0,000 (*p value* < 0,05) sehingga disimpulkan terdapat hubungan antara lama rawat dengan kecemasan keluarga diruang ICU rumah sakit Panti Rapih Yogyakarta dengan *p value* 0,000.

5.2 Saran

5.2.1 Teoritis

Secara teoritis, lama rawat pasien diruang ICU akan membuat keluarga yang menunggu khawatir dan cemas terhadap kondisi pasien apakah mengalami perbaikan atau perburukan kondisi kesehatannya.

5.2.2 Praktis

5.2.2.1 Bagi Manajemen Rumah Sakit Panti Rapih

Rumah sakit Panti Rapih disarankan dapat memberikan layanan pendampingan bagi keluarga yang menunggu pasien diruang ICU pada pasien yang telah dirawat > 5 hari agar keluarga dan pasien merasa mendapatkan dukungan dari pihak rumah sakit.

5.2.2.2 Bagi Perawat ICU

Disarankan perawat dapat memberikan informasi secara jelas dan akurat terhadap kondisi pasien kepada keluarga yang menunggu sehingga keluarga dapat mengetahui secara jelas terkait kondisi pasien selama perawatan.

5.2.2.3 Bagi Keluarga Pasien

Bagi keluarga disarankan lebih aktif dalam mencari informasi tentang kondisi pasien dan mampu memahami setiap informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan agar dapat bijak dalam pengambilan keputusan terhadap proses perawatan yang dilakukan selama pasien diruang ICU.

5.2.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian berikutnya melakukan analisa yang lebih mendalam untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan keluarga yang menunggu di ruang ICU.